

**ДЕРЖАВНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ТЕСТУВАННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ
НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ «МЕДИЦИНА» І «ФАРМАЦІЯ» ПРИ МІНІСТЕРСТВІ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

Варіант / Variant_ 1-Б

**ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЄДКІ ЗДОБУВАЧАМИ
ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ**

Спеціальність

«МЕДСЕСТРИНСТВО»

2023-2024 н.р. (літо)

1. Укажіть частий побічний ефект, що може розвинути в пацієнта під час внутрішньовенного введення 1 %-го розчину нікотинової кислоти.
- A. Порушення зору
 - B. Відчуття жару в тілі**
 - C. Закреп
 - D. Брадикардія
 - E. Сонливість
2. Роділлю проінформовано про активне ведення третього періоду фізіологічних пологів, що передбачає введення утеротоніків — 10 ОД окситоцину. Який шлях його введення в цьому разі?
- A. Внутрішньошкірно
 - B. Внутрішньовенно струминно
 - C. Внутрішньом'язово**
 - D. Ректально
 - E. Підшкірно
3. У пацієнтки перебіг цукрового діабету ускладнився розвитком синдрому діабетичної стопи. Які поради по догляду за нижніми кінцівками необхідно надати пацієнтці?
- A. Приймати гарячі ванни для ніг
 - B. Не ходити босоніж**
 - C. Носити відкрите взуття
 - D. Користуватися пемзою
 - E. Використовувати тальк
4. У чоловіка після роботи з електроприладом на долоні правої руки візуалізується ділянка некрозу шкіри — біло-сіра пляма діаметром 4 мм. Який вид місцевої електротравми спостерігається в чоловіка?
- A. Механічне ушкодження
 - B. Електричний опік
 - C. Металізація шкіри
 - D. Електричний знак**
 - E. Електроофтальмія
5. Укажіть найінформативніший метод діагностики набутих вад серця.
- A. Ехокардіографія**
 - B. Ангіографія
 - C. Пульсоксиметрія
 - D. Спірометрія
 - E. Реовазографія
6. Укажіть біологічно активну речовину, що міститься у секреті слинних залоз медичних п'явок.
- A. Гістамін
 - B. Лізоцим
 - C. Фібринолізин
 - D. Гепарин
 - E. Гірудин**

7. Для якого захворювання характерний такий симптомокомплекс: «маскоподібне обличчя», кисетоподібні складки навколо рота, синдром Рейно?
- A. Ревматоїдного артриту
 - B. Червоного системного вовчака
 - C. **Системної склеродермії**
 - D. Вузликового периартеріїту
 - E. Гострої ревматичної гарячки
8. У пацієнтки, яка хворіє на цукровий діабет 1-го типу, після випадкового передозування інсуліну виникло відчуття голоду, з'явилися різка слабкість, запаморочення, занепокоєння, тремтіння рук, підвищене потовиділення, прискорене серцебиття. Свідомість збережена. Які заходи долікарської допомоги необхідно надати пацієнтці насамперед?
- A. Запропонувати прийняти 15-20 крапель корвалолу
 - B. Увести інсулін підшкірно
 - C. **Запропонувати вжити прості вуглеводи (цукор, солодку воду)**
 - D. Застосувати нітрогліцерин сублінгвально
 - E. Дати вдихнути пари нашатирного спирту
9. Пацієнт скаржиться на втрату апетиту, гіркий присмак у роті, біль і відчуття тяжкості у правому підребер'ї, жовтяничність шкіри і склер, свербіж шкіри, біль у суглобах. За результатами біохімічного дослідження крові виявлено: високий рівень прямого білірубіну, виражена активність аланінамінотрансферази. Для якого захворювання характерні вказані клініко-лабораторні показники?
- A. Хвороби Крона
 - B. Хронічного панкреатиту
 - C. Виразкової хвороби шлунка
 - D. Гострого гастриту
 - E. **Хронічного гепатиту**
10. Пацієнту встановлено діагноз: гострий пієлонефрит. Чим зумовлений біль у поперековій ділянці, що характерний для цього захворювання?
- A. Уремією
 - B. Підвищенням артеріального тиску
 - C. Корінцевим синдромом
 - D. **Розтягненням ниркової капсули**
 - E. Дизуричними розладами
11. Розвиток якого патологічного стану вказує на те, що в пацієнта триває III стадія артеріальної гіпертензії?
- A. Тиреотоксикозу
 - B. **Ниркової недостатності**
 - C. Дихальної недостатності
 - D. Печінкової недостатності
 - E. Діабетичної нефропатії
12. Пацієнту призначено фізіотерапевтичну процедуру, під час якої (внаслідок змінення проникності судинної стінки) у шкірі виникають точкові мікрокрововиливи (петехії, плями), до складу яких входять біологічно активні речовини, що надають потужний стимулювальний ефект як на весь організм, так і на певну зону до повного їх розсмоктування. Яку процедуру призначено пацієнту?

- A. Накладання зігрівального компресу
 - B. УВЧ-терапію
 - C. Накладання гірчичників
 - D. Застосування медичної грілки
 - E. **Вакуум-терапію медичними банками**
13. Укажіть необхідне оснащення точки догляду за пацієнтом.
- A. Кран із ліктьовим механізмом
 - B. Диспенсер із паперовими одноразовими рушниками
 - C. Диспенсер із рідким милом
 - D. **Диспенсер з антисептиком**
 - E. Умивальник
14. У пацієнта, який перебуває в реанімаційному відділенні, спостерігається хвилеподібна зміна амплітуди дихання з паузами між хвилями 40-50 с. Укажіть патологічний тип дихання.
- A. Задуха
 - B. Біота
 - C. Куссмауля
 - D. Апноє
 - E. **Чейна-Стокса**
15. У породіллі після пологів виявлено розрив задньої спайки та стінки піхви, а також шкіри промежини довжиною 1 см, м'язи промежини неушкоджені. Укажіть ступінь розриву промежини.
- A. II
 - B. I
 - C. III
 - D. –
 - E. IV
16. У пацієнта після вживання лісових горіхів раптово виникли захриплість голосу, «гавкаючий кашель», утруднене дихання. Об'єктивно спостерігається: пацієнт стривожений, шкіра обличчя ціанотична, повіки та губи набряклі, щільні на дотик, свербіж немає, пульс — 84/хв, ритмічний, АТ — 110/70 мм рт. ст. Який патологічний стан розвинувся в пацієнта?
- A. Аспірація стороннього тіла
 - B. Кропив'янка
 - C. **Набряк Квінке**
 - D. Дифтерійний круп
 - E. Анафілактичний шок
17. У пацієнта гематологічного відділення на шкірі тулуба візуалізується петехіально-плямистий висип різноманітного кольору (від пурпурно-червоного до зеленуватого і жовтого), у місцях стискання тулуба та кінцівок одягом — дрібні гематоми. В аналізі крові: тромбоцити — $50 \cdot 10^9/\text{л}$, час кровотечі подовжений. Для якого захворювання характерні ці клініко-лабораторні показники?
- A. Хронічного мієлолейкозу
 - B. Гсморлітичної анемії
 - C. Гемофілії А
 - D. Лімфогранулематозу

Е. Ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури

18. У роділлі триває латентна фаза першого періоду фізіологічних пологів. Пологи I, вагітність II, термін вагітності — 38 тижнів. Укажіть сучасний безпечний метод функціональної діагностики, який застосовується для одночасного динамічного спостереження за внутрішньоутробним станом плода та скоротливою здатністю матки.

- A. Ультрасонографія
- B. **Кардіотокографія**
- C. Сцинтиграфія
- D. Електрокардіографія
- E. Електроміографія

19. Який лікарський засіб використовується для надання невідкладної допомоги пацієнту у разі виникнення колапсу?

- A. Фуросемід
- B. **Кордіамін**
- C. Клофелін
- D. Папаверин
- E. Строфантин

20. Дієтотерапія — це метод лікування за допомогою раціонального харчування. Що означає принцип заміщення в дієтотерапії?

- A. **Уведення в раціон харчування продуктів, у компонентах яких організм має дефіцит**
- B. Уникання можливості вживання продуктів, забруднених мікробами
- C. Вживання продуктів харчування з тривалим терміном придатності
- D. Виключення з раціону харчування їжі, багатой на клітковину
- E. Збалансування раціону харчування щодо білків, жирів, вуглеводів

21. Який вид гастриту (за характером патологічних змін слизової оболонки шлунка) може розвинутися в потерпілої особи внаслідок випадкового споживання концентрованої кислоти (зокрема оцтової кислоти)?

- A. Еритематозний
- B. Флегмонозний
- C. **Корозивний**
- D. Катаральний
- E. Фібринозний

22. Пацієнт скаржиться на підвищення температури тіла до 39°C, головний біль та різкий розпираючий біль у ділянці задньої поверхні шиї. Об'єктивно спостерігається: на ураженій ділянці шиї візуалізується щільний інфільтрат темно-червоного кольору, діаметром 7-8 см, різко болючий під час пальпації, вкритий дрібними множинними отворами, із яких виділяється гнійна рідина (симптом «сита»), Який запальний процес розвинувся в пацієнта?

- A. Фурункул
- B. Гідраденіт
- C. **Карбункул**
- D. Фурункульоз
- E. Бешиха

23. Як називається графічний запис вимірювання висоти стояння дна матки (ВДМ) з метою динамічного спостереження за зростанням плода, починаючи з 20-го тижня вагітності?
- A. Кардіограма
 - B. Міограма
 - C. Партограма
 - D. Токограма
 - E. **Гравідограма**
24. Як називається індивідуальна упаковка, що безпосередньо контактує з лікарським засобом та сприяє збереженню його основних властивостей?
- A. Зовнішня
 - B. Вторинна
 - C. Спеціальна
 - D. Загальна
 - E. **Первинна**
25. Пацієнту віком 35 років встановлено діагноз: сухий плеврит. Які клінічні прояви характерні для цього захворювання?
- A. Стискальний біль за грудниною з іррадіацією в ліву руку, що триває близько 5 хв
 - B. **Біль у грудній клітці, що посилюється під час глибокого вдиху та нахилах тулуба в протилежний бік**
 - C. Експіраторна задишка, кашель із виділенням склоподібного в'язкого мокротиння
 - D. Кашель із виділенням слизово-гнійного мокротиння, задишка, підвищення температури тіла до субфебрильних цифр
 - E. Кашель із виділенням гнійного мокротиння, переважно вранці, «повним ротом»
26. У чоловіка віком 62 роки після стресу раптово розвинулися загальна слабкість, прискорене серцебиття та різкий стискальний біль за грудниною, що іррадіює в ліву руку та не минає після приймання нітрогліцерину. Який патологічний стан, найімовірніше, розвинувся в пацієнта?
- A. Міокардит
 - B. **Інфаркт міокарда**
 - C. Печінкова колика
 - D. набряк легень
 - E. Напад стенокардії
27. Чоловіку віком 34 роки встановлено попередній діагноз: менінгококовий менінгіт та з діагностичною метою призначено спинномозкову пункцію. Який медичний інструмент треба підготувати сестрі медичній для проведення цієї процедури?
- A. Біопсійну голку
 - B. Голку Касирського
 - C. Голку Дюфо
 - D. **Голку Біра**
 - E. Троакар

28. Яка шкала використовується для догоспітальної діагностики гострого порушення мозкового кровообігу?
- A. NIHSS
 - B. NRS
 - C. **FAST**
 - D. MMSE
 - E. ABCDE
29. Пацієнтці віком 52 роки встановлено діагноз: системний червоний вовчак. Які з нижченаведених симптомів характерні для цього захворювання?
- A. «Маскоподібне обличчя», кисетоподібні складки навколо рота, ущільнення шкіри кистей та розвиток їх контрактур
 - B. Ранкова скутість, біль у дрібних суглобах кистей і стоп, деформація суглобів
 - C. **Еритематозний висип на спинці носа та вилицях у вигляді «метелика», біль у м'язах, підвищення температури тіла до фебрильних цифр**
 - D. Летючий характер болю у великих суглобах, підвищення температури тіла до субфебрильних цифр
 - E. Відчуття оніміння пальців рук, зниження чутливості кінцівок за типом «рукавичок» і «шкарпеток»
30. Пацієнту призначено підшкірне введення олійного розчину. Які дії має виконати сестра медична для попередження розвитку медикаментозної емболії під час виконання ін'єкції?
- A. Дотримуватися правил асептики
 - B. Змінювати місце ін'єкцій
 - C. Перевірити кут і глибину введення голки
 - D. **Перевірити, чи не потрапила голка в просвіт кровоносної судини**
 - E. Промасажувати місце ін'єкції стерильною ватною кулькою
31. Пацієнтка віком 23 роки скаржиться на періодичний біль унизу живота, незначні кров'яністі виділення зі статевих шляхів та затримку менструації впродовж 6-ти тижнів. Попередній діагноз: позаматкова вагітність. Рівень якого гормону доцільно дослідити в крові жінки для підтвердження цього діагнозу?
- A. Пролактину
 - B. Естрадіолу
 - C. **Хоріонічного гонадотропіну**
 - D. Окситоцину
 - E. Прогестерону
32. Старша сестра медична інструктує своїх підлеглих щодо правил гігієни рук. Який тип нагадування на робочому місці є найефективнішим для активізації уваги?
- A. Аудіоповідомлення
 - B. Накази
 - C. **Інформаційні плакати**
 - D. Санбюлетні
 - E. Конференції
33. У пацієнта спостерігаються клінічні прояви харчової алергії. Яке з нижченаведених досліджень є найінформативнішим для встановлення причини алергії?
- A. Загальний аналіз крові
 - B. **Шкірна скарифікаційна проба**

- C. Проба Манту
- D. Біопсія шкіри
- E. Біохімічний аналіз крові

34. Чоловік віком 37 років скаржиться на нудоту, блювання, сухість у роті, відчуття «туману» перед очима, утруднення під час ковтання. Вказані симптоми з'явилися через добу після вживання в'яленої риби. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

- A. Поліомієліту
- B. Шигельозу
- C. Сальмонельозу
- D. Харчової токсикоінфекції
- E. **Ботулізму**

35. Пацієнту в першу добу після травми показане прикладання міхура з льодом до місця ушкодження. Оберіть правильний режим його застосування, щоб уникнути місцевого переохолодження.

- A. Кожні 5 хв робити перерву на 20-30 хв
- B. **Кожні 20 хв робити перерву на 10-15 хв**
- C. Кожні 60 хв робити перерву на 20-30 хв
- D. -
- E. Кожні 40 хв робити перерву на 10-15 хв

36. Який із нижченаведених методів дослідження є найінформативнішим для діагностики туберкульозу легень?

- A. Спірометрія
- B. Біохімічний аналіз крові
- C. Стернальна пункція
- D. **Оглядова рентгенографія органів грудної клітки**
- E. Загальний аналіз крові

37. Вагітній жінці діагностовано тазове передлежання плода. У якому терміні вагітності можна виконати операцію зовнішнього повороту плода, для того, щоб вагітність закінчилася пологами через природні пологові шляхи?

- A. 38 тижнів
- B. 40 тижнів
- C. 28 тижнів
- D. 42 тижні
- E. **36 тижнів**

38. Який етіологічний фактор має вирішальне значення у розвитку гострого гломерулонефриту?

- A. Порушення обміну речовин
- B. **Інфікування β -гемолітичним стрептококом**
- C. Аутоімунні захворювання
- D. Професійні інтоксикації
- E. Споживання гострої та жирної їжі

39. Укажіть типове ускладнення інтерстиціальної пневмонії.
- A. Бронхіальна астма
 - B. Емфізема легень
 - C. Легенева кровотеча
 - D. **Пневмосклероз**
 - E. Кардіосклероз
40. Лікар-педіатр ЦПМСД встановив восьмирічній дитині діагноз: скарлатина. Який документ необхідно заповнити для обліку цього захворювання?
- A. Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів
 - B. Медичну карту стаціонарного хворого
 - C. Контрольну карту диспансерного нагляду
 - D. Медичну карту амбулаторного хворого
 - E. **Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання**
41. У пульмонологічному відділенні лікується пацієнт із діагнозом: бронхоектатична хвороба. Який метод фізіотерапії використовується для покращення відходження слизу та мокротиння з дихальних шляхів?
- A. Парафінові аплікації
 - B. Фонофорез
 - C. Кріотерапія
 - D. **Постуральний дренаж**
 - E. Зігрівальні компреси
42. Упродовж якого терміну часу потрібно провести обстеження на ВІЛ медичного працівника, у якого відбувся контакт із джерелом потенційного інфікування ВІЛ, пов'язаний із виконанням професійних обов'язків?
- A. 1-го місяця
 - B. **5-ти днів**
 - C. 14-ти днів
 - D. 3-х місяців
 - E. 2-х місяців
43. Укажіть причину ранньої післяпологової кровотечі, яку можна виявити, оглядаючи послід.
- A. Порушення виділення плаценти
 - B. Защемлення плаценти
 - C. Порушення зсідання крові
 - D. Щільне прикріплення плаценти
 - E. **Затримка частин плаценти в порожнині матки**
44. Щеплення новонароджених дітей від туберкульозу проводиться шляхом внутрішньошкірного введення вакцини БЦЖ. Яке ускладнення розвивається у разі випадкового потрапляння вакцини під шкіру?
- A. Інфільтрат
 - B. Виразка
 - C. **«Холодний абсцес»**
 - D. Олійна емболія
 - E. Ліподистрофія

45. Укажіть порушення діурезу, що характеризується зменшенням добової кількості сечі.
- A. **Олігурія**
 - B. Полакіурія
 - C. Дизурія
 - D. Поліурія
 - E. Ніктурія
46. Жінка отримала опік передньої поверхні обох ніг, задньої поверхні тулуба та промежини. Визначте площу опікового ураження за «правилом дев'яток».
- A. 19%
 - B. 25%
 - C. **37%**
 - D. 51%
 - E. 39%
47. У пацієнта після укусу бджоли раптово виник сильний головний біль, з'явилися психоемоційне збудження, нудота, парестезії, а згодом — судоми з втратою свідомості та мимовільним сечовипусканням і дефекацією. АТ — 70/40 мм рт. ст. Який варіант анафілактичного шоку розвинувся в пацієнта?
- A. Абдомінальний
 - B. Гемодинамічний
 - C. Асфіктичний
 - D. **Церебральний**
 - E. Кардіогенний
48. Сестра медична проводить сортування медичних відходів після виконання лікарських призначень. До якої категорії відходів належить первинна упаковка отруйного лікарського засобу?
- A. -
 - B. D
 - C. **C**
 - D. A
 - E. B
49. Пацієнт скаржиться на біль у надлобковій ділянці, неможливість випорожнити сечовий міхур. Сечовиділення відсутнє впродовж 12 год. Який патологічний стан розвинувся в пацієнта?
- A. Ниркова коліка
 - B. Поліурія
 - C. Ніктурія
 - D. **Гостра затримка сечі**
 - E. Олігурія
50. У якому періоді менструального циклу найчастіше виникає апоплексія яєчника?
- A. У період менструації
 - B. У період регресу жовтого тіла
 - C. У лютеїновій фазі
 - D. У фолікуліновій фазі
 - E. **У період овуляції**

51. Для якого захворювання травної системи типові такі особливості больового синдрому: біль в епігастрії з'являється натщесерце, вночі або через 3-4 год після останнього вживання їжі та зникає навіть після незначного вживання будь-яких продуктів харчування?
- A. Хронічного холециститу
 - B. Хронічного атрофічного гастриту
 - C. **Виразкової хвороби дванадцятипалої кишки**
 - D. Хронічного панкреатиту
 - E. Виразкової хвороби шлунка
52. Чоловіку віком 40 років встановлено попередній діагноз: геморагічний інсульт. У якому положенні потрібно транспортувати пацієнта до стаціонару?
- A. **На спині, з припіднятою головою**
 - B. На животі, з підкладеним під грудну клітку валиком
 - C. На спині, з припіднятими нижніми кінцівками
 - D. На правому боці
 - E. Сидячи
53. Пацієнтка віком 23 роки скаржиться на різкий біль у правій клубовій ділянці з іррадіацією в пряму кишку, короткочасне запаморочення, які виникли після фізичного навантаження. З анамнезу відомо, що остання менструація була 3 тижні тому, менструальний цикл регулярний, пацієнтка використовує бар'єрні методи контрацепції. Об'єктивно спостерігається: шкірні покриви бліді, АТ — 100/60 мм рт. ст., пульс — 90/хв, живіт напружений у нижніх відділах. Результати гінекологічного дослідження: слизова оболонка шийки матки блідо-рожевого кольору, матка не збільшена, щільної консистенції, безболісна, придатки матки праворуч різко болючі, зліва — без особливостей, заднє склепіння піхви згладжене, болюче, виділення зі статевих шляхів слизові. Який патологічний стан розвинувся в пацієнтки?
- A. Прогресуюча позаматкова вагітність
 - B. Гострий апендицит
 - C. Порушена позаматкова вагітність
 - D. **Апоплексія яєчника**
 - E. Гострий сальпінгоофорит
54. Сестра медична, надаючи медичну допомогу пацієнту, в якого розвинувся напад стенокардії, застосувала нітрогліцерин 0,5 мг сублінгвально. Укажіть фармакологічну властивість цього лікарського засобу.
- A. **Розширює коронарні судини**
 - B. Покращує метаболізм
 - C. Поліпшує функцію ендотелію
 - D. Підвищує силу і швидкість скоротливості міокарда
 - E. Розслабляє гладку мускулатуру бронхів
55. До приймального відділення шпиталізовано жінку віком 28 років у непритомному стані. Зі слів родичів з'ясувалося, що вона хворіє на цукровий діабет, 3 дні тому її стан погіршився, з'явилися нудота, блювання, біль у животі, сонливість. Об'єктивно спостерігається: шкіра суха, запах ацетону з рота, ЧД — 30/хв, пульс — 100/хв, слабого наповнення, АТ — 85/55 мм рт. ст. Для якого виду коми характерні ці клінічні прояви?
- A. Уремичної
 - B. Гіпоглікемічної
 - C. Печінкової

- D. Церебральної
- E. **Гіперглікемічної**

56. Який найпростіший фізіотерапевтичний метод використовується для надання долікарської допомоги потерпілій особі у перші 2-3 год після забою колінного суглоба без пошкодження шкіри?

- A. **Прикладання міхура з льодом до місця травми**
- B. Накладання гірчичників
- C. Прикладання грілки до місця травми
- D. Занурення травмованої кінцівки в гарячу воду
- E. Накладання зігрівального компресу

57. У пацієнта, який довгий час хворіє на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки, спостерігається зміна симптоматики: біль у животі став оперізувальним постійним, інтенсивним, припинив залежати від уживання їжі. Яке ускладнення основного захворювання, найімовірніше, розвинулося в пацієнта?

- A. Пілоростеноз
- B. Перфорація
- C. Ахалазія кардії
- D. **Пенетрація**
- E. Малігнізація

58. У пацієнта нефрологічного відділення під час лабораторного дослідження сечі виявлено: олігурію, гематурію, протеїнурію. В осаді сечі: нирковий епітелій, гіалінові та зернисті циліндри. Для якого захворювання нирок характерні ці лабораторні зміни?

- A. Гострого циститу
- B. Гострого пієлонефриту
- C. Сечокам'яної хвороби
- D. Хронічного пієлонефриту
- E. **Гострого гломерулонефриту**

59. Пацієнт перебуває на стаціонарному лікуванні в травматологічному відділенні у зв'язку з переломом верхньої кінцівки. Укажіть правильну послідовність одягання нательної білизни (сорочки) на пацієнта в цьому разі.

- A. Через голову, потім на здорову руку, далі на хвору руку і розправити
- B. Через голову, потім на хвору руку, далі на здорову руку і розправити
- C. Спочатку на хвору руку, потім через голову, далі на здорову руку і розправити
- D. Спочатку на здорову руку, потім на хвору руку, далі через голову і розправити
- E. **Спочатку на хвору руку, потім на здорову руку, далі через голову і розправити**

60. Який режим фізичної активності необхідно забезпечити пацієнту, в якого спостерігається активна фаза перебігу хронічного пієлонефриту (температура тіла — 39,0°C, слабкість, біль у поперековій ділянці тощо)?

- A. Активний
- B. **Ліжковий**
- C. Палатний
- D. Загальний
- E. Кімнатний

61. Яка з нижченаведених груп лікарських засобів використовується для етіотропного лікування хронічного пієлонефриту?
- A. Антитромботичні
 - B. Нестероїдні протизапальні
 - C. Діуретики
 - D. Антигістамінні
 - E. **Антибактеріальні**
62. Для якого клінічного варіанта інфаркту міокарда характерні відсутність больового синдрому та наявність сухого кашлю та прогресуючої задишки?
- A. Ангінозного
 - B. Аритмічного
 - C. Церебрального
 - D. Гастралгічного
 - E. **Астматичного**
63. Які параметри враховуються під час оцінювання ефективності пологової діяльності?
- A. Розміри голівки плода та ступінь її конфігурації
 - B. **Частота, тривалість та інтенсивність перейм**
 - C. Розміри площини входу в малий таз та зовнішньої кон'югати
 - D. Б. Артеріальний тиск роділлі та частота серцевих скорочень плода
 - E. E. –
64. Який із нижченаведених факторів ризику зумовлює виникнення серцево-судинних захворювань у людей віком понад 40 років?
- A. Анемія
 - B. Вірусні інфекції
 - C. **Гіперхолестеринемія**
 - D. Спадковість
 - E. Диспротеїнемія
65. У пацієнта одразу після введення вакцини з'явилися різка слабкість, запаморочення, прискорене серцебиття, утруднення дихання, відчуття страху смерті, шум у вухах. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, вкрита холодним потом, дихання часте, поверхневе, пульс — 120/хв, слабкого наповнення, АТ — 70/30 мм рт. ст. Який патологічний стан розвинувся в пацієнта?
- A. Напад бронхіальної астми
 - B. Кардіогенний шок
 - C. Гіповолемічний шок
 - D. **Анафілактичний шок**
 - E. набряк Квінке
66. Пацієнт скаржиться на розпираючий біль унизу живота та неспроможність самостійно спорожнити сечовий міхур упродовж 10-ти годин. В анамнезі: сечокам'яна хвороба. Укажіть заходи невідкладної допомоги пацієнту в цьому разі.
- A. Обмеження вживання рідини
 - B. Прикладання міхура з льодом на низ живота
 - C. **Катетеризація сечового міхура**
 - D. Обмеження вживання харчової солі

Е. Літотрепсія (дроблення каменів у нирках)

67. Пацієнтка віком 56 років скаржиться на сухість у роті, невгамовну спрагу, загальну слабкість, постійне відчуття голоду, втрату маси тіла, свербіж шкіри, часте сечовипускання, порушення зору. Об'єктивно спостерігається: шкіра суха, лущиться, помітні сліди від подряпин, пульс — 78/хв, АТ — 150/85 мм рт. ст. Глюкоза крові — 8,4 ммоль/л. Для якого захворювання характерні ці клініко- лабораторні симптоми?

- А. Кропив'янки
- В. Гіпертиреозу
- С. Гіпотиреозу
- Д. **Цукрового діабету**
- Е. Корости

68. До перинатального центру у відділення інтенсивної терапії шпиталізовано вагітну жінку (вагітність II, термін вагітності — 37 тижнів) зі скаргами на постійний головний біль, погіршення зору, мерехтіння «мушок» перед очима, блювання, гострий біль в епігастрії. Об'єктивно спостерігається: загальний стан тяжкий, генералізовані набряки, АТ — 170/110 мм рт. ст. У загальному аналізі сечі: протеїнурія — 3,5 г/добу. З анамнезу відомо, що підвищення АТ у жінки раніше не спостерігалось. Для якого патологічного стану характерні ці клініко-лабораторні показники?

- А. Помірної прееклампсії
- В. **Тяжкої прееклампсії**
- С. Хронічної серцевої недостатності
- Д. Гестаційної гіпертензії
- Е. Феохромоцитомі

69. Чоловік віком 54 роки скаржиться на зниження апетиту, біль у правому підребер'ї, нудоту, здуття живота, слабкість. Об'єктивно спостерігається: субіктеричність склер, «судинні зірочки» на шкірі, почервоніння долонь, на передній черевній стінці візуалізуються розширені підшкірні вени («голова медузи»), асцит. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

- А. Хронічного гастриту
- В. Жовчнокам'яної хвороби
- С. **Цирозу печінки**
- Д. Хронічного панкреатиту
- Е. Хронічного холециститу

70. У пацієнта після внутрішньовенного введення антибіотика розвинувся анафілактичний шок. Який препарат використовується насамперед для надання невідкладної допомоги пацієнту?

- А. Нітрогліцерин
- В. Фуросемід
- С. Дротаверин
- Д. **Епінефрин**
- Е. Кофеїн

71. У пацієнта розвинувся ангіоневротичний набряк. Лікарські засоби якої фармакологічної групи потрібно застосовувати для надання невідкладної допомоги пацієнту?

- А. **Антигістамінні**
- В. Антациди

- C. Анальгетики
- D. Антибіотики
- E. Антихолінестеразні

72. Пацієнту встановлено діагноз: гострий лейкоз та призначено медикаментозну терапію. Препарати якої групи порушують процеси росту, розвитку та механізми поділу всіх клітин організму, включаючи злоякісні?

- A. Гепатопротектори
- B. Антибіотики
- C. Противірусні
- D. Кардіопротектори
- E. **Цитостатики**

73. Під яким кутом потрібно ввести голку інсулінового шприца в підшкірно-жирову клітковину, якщо її довжина 10 мм?

- A. 40°
- B. 30°
- C. **90°**
- D. 45°
- E. 15°

74. У пацієнта, який хворіє на хронічну ниркову недостатність, розвинулася уремія. Який із нижченаведених симптомів свідчить про розвиток цієї патології?

- A. **Запах аміаку з рота**
- B. Гіперемія шкірних покривів
- C. Підвищення апетиту
- D. Підвищення температури тіла
- E. Збільшення лімфатичних вузлів

75. У жіночій консультації вагітній жінці проведено пельвіометрію. Який розмір жіночого таза враховується у діагностиці (визначенні ступеня звуження) анатомічно вузького таза?

- A. **Справжня кон'югата**
- B. Міжостьова відстань
- C. Міжгребенева відстань
- D. Міжвертлюгова відстань
- E. Зовнішня кон'югата

76. Укажіть ЕКГ-ознаки, що характерні для нападу стенокардії.

- A. Високі зубці Р
- B. Глибокий і широкий зубець Q
- C. Дугоподібний сегмент ST над ізолінією
- D. **Високий, гострий зубець Т, сегмент ST нижче ізолінії**
- E. Низький вольтаж комплексу QRS

77. Сестрі медичній у приміщеннях для зберігання лікарських засобів потрібно стежити за певними параметрами та щоденно фіксувати отримані дані у відповідній документації. Укажіть ці параметри.

- A. Температура та вологість повітря
- B. **Терміни придатності лікарських засобів**
- C. Швидкість руху повітря та стерильність повітряного середовища

- D. Яскравість природного та штучного освітлення
 - E. Справність сигналізації та камер відеоспостереження
78. Для діагностики якого захворювання використовується реакція Ваалера-Роуза?
- A. Системної склеродермії
 - B. Системного червоного вовчака
 - C. Деформуючого остеоартрозу
 - D. **Ревматоїдного артриту**
 - E. Дерматоміозиту
79. Пацієнт віком 14 років скаржиться на підвищення температури тіла до 37,6°C, пітливість, головний біль, загальну слабкість. В анамнезі: контакт із хворим на туберкульоз. У крові: лімфоцитоз, підвищення ШОЕ. Виявлено віраж туберкулінових проб. Який патологічний процес розвивається в організмі пацієнта?
- A. Первинний туберкульозний комплекс
 - B. **Первинна туберкульозна інтоксикація**
 - C. Міліарний туберкульоз
 - D. Гострий бронхіт
 - E. Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів
80. Яка окружність талії в чоловіків асоціюється з високим ризиком розвитку артеріальної гіпертензії, хвороб серця, порушень вуглеводного обміну тощо?
- A. 88 см
 - B. 75 см
 - C. **102 см**
 - D. 60 см
 - E. 90 см
81. Укажіть місце перебування породіллі упродовж найближчих двох годин після завершення фізіологічних пологів.
- A. У відділенні патології вагітних
 - B. У відділенні екстрагенітальної патології
 - C. **У пологовій залі**
 - D. У гінекологічному відділенні
 - E. У післяпологовому відділенні
82. Пацієнту для лікування геморою призначено ректальне введення супозиторіїв із новокаїном. Укажіть особливості умов зберігання супозиторіїв.
- A. **За температури повітря не вище ніж 25°C**
 - B. В окремій шафі
 - C. У темному місці
 - D. У приміщенні з витяжною вентиляцією
 - E. У сухому темному місці
83. У пацієнта розвинулися симптоми гострого гастриту в результаті споживання неякісної їжі. Які заходи долікарської допомоги необхідно надати пацієнту насамперед?
- A. Прикласти міхур із льодом на епігастральну ділянку
 - B. **Промити шлунок**
 - C. Застосувати очисну клізму
 - D. Провести сліпе зондування
 - E. Прикласти грілку на епігастральну ділянку

84. Реабілітаційна програма для збереження функції уражених суглобів у пацієнтів із ревматоїдним артритом зазвичай включає різні методи лікування. Укажіть метод, що спрямований на поліпшення рухливості та функції суглобів.

- A. Міостимуляція
- B. Пневмопресинг
- C. Вакуумний масаж
- D. Вісцеральна терапія
- E. **Механотерапія**

85. Яка анатомічна ділянка тіла людини використовується для введення вакцини БЦЖ?

- A. Підлопаткова ділянка
- B. Верхній зовнішній квадрант сідниці
- C. Передня поверхня стегна
- D. Середня третина внутрішньої поверхні передпліччя
- E. **Зовнішня поверхня верхньої третини лівого плеча**

86. Пацієнт віком 18 років скаржиться на підвищення температури тіла до 38,2°C, набряк і почервоніння правої щоки. Об'єктивно спостерігається: у ділянці правої щоки визначається інфільтрат, болючий під час пальпації, шкіра над ним напружена, гіперемована, у центрі інфільтрату візуалізується стрижень у вигляді сіро-зелених мас. Який запальний процес розвинувся в пацієнта?

- A. **Фурункул**
- B. Карбункул
- C. Абсцес
- D. Гідраденіт
- E. Флегмона

87. Споживання продуктів зі збагаченим вмістом якого мікроелемента потрібно порекомендувати пацієнту, який хворіє на хронічну серцеву недостатність?

- A. Кальцію
- B. Натрію
- C. Заліза
- D. **Калію**
- E. Цинку

88. Як називається спосіб комунікації, що передбачає цілеспрямоване використання словесних висловлювань (мовлення) для передачі інформації?

- A. **Вербальна**
- B. Офіційна
- C. Невербальна
- D. Дистанційна
- E. Виховна

89. Для якого захворювання характерні такі клінічні прояви: гарячка, кашель (сухий, згодом вологий із виділенням слизово-гнійного мокротиння), посилення голосового тремтіння під час пальпації грудної клітки, задишка?

- A. Бронхіальної астми
- B. Гострого стенозуючого ларинготрахеїту
- C. **Пневмонії**
- D. Спонтанного пневмотораксу

Е. Гострого бронхіту

90. Який вид пов'язки використовується для фіксації кінцівки у разі перелому ключиці без зсуву уламків?

- А. Дезо
- В. Циркулярна
- С. Черепашача
- Д. Колосоподібна
- Е. Т-подібна

91. Яке ускладнення може розвинути в пацієнта під час проведення абдомінальної пункції у разі швидкого видалення великого об'єму рідини?

- А. Блювання
- В. Ушкодження внутрішніх органів
- С. Пневмоторакс
- Д. Шлункова кровотеча
- Е. Колапс

92. Які лікарські засоби належать до списку «Б»?

- А. Психотропні
- В. **Сильнодіючі**
- С. Наркотичні
- Д. Отруйні
- Е. Імунобіологічні

93. Тяжкохворий пацієнт хоспісу перебуває на ліжковому режимі. З якою метою використовується шкала Braden під час догляду за пацієнтом?

- А. **Оцінювання ступеня виникнення ризику пролежнів**
- В. Оцінки психоемоційного стану
- С. Корекції психоемоційного стану
- Д. Розрахунку індексу маси тіла
- Е. Планування реабілітаційних заходів

94. Жінка перебуває на 30-му тижні вагітності. Вагітність II, багатоплідна (монохоріональна моноамніотична двійня). Стан матері та плодів задовільний. Враховуючи тип розвитку двійні, жінку попередили, що пологи відбуватимуться шляхом кесаревого розтину. У якому терміні вагітності його оптимально провести в цьому разі?

- А. 37 тижнів
- В. 38 тижнів
- С. 40 тижнів
- Д. 36 тижнів
- Е. **32 тижні**

95. У пацієнта віком 20 років захворювання розпочалося гостро, з підвищення температури тіла до 39,2°C, сильного головного болю та болю у м'язах. Через декілька годин на шкірі тулуба та задньої поверхні стегон з'явився геморагічний висип зірчастої форми. Які менінгеальні симптоми потрібно перевірити в пацієнта насамперед?

- А. Кера, Ортнера
- В. **Керніга, Брудзинського**
- С. Хвостека, Труссо
- Д. Пастернацького, Ровзінга

Е. Бабінського, Россалімо

96. Укажіть метод ендоскопічного дослідження внутрішньої поверхні сечового міхура.

- А. **Цистоскопія**
- В. Езофагогастроуденоскопія
- С. Ректороманоскопія
- Д. Бронхоскопія
- Е. Колоноскопія

97. Під час лабораторного дослідження мокротиння пацієнта виявлено спіралі Куршмана, кристали Шарко-Лейдена та еозинофіли. Для якого захворювання характерні такі лабораторні зміни в аналізі мокротиння?

- А. Бронхоектатичної хвороби
- В. Сухого плевриту
- С. Туберкульозу легень
- Д. Гострого бронхіту
- Е. **Бронхіальної астми**

98. Пацієнту, який хворіє на залізодефіцитну анемію, призначено терапію препаратами заліза. Одночасне приймання якого вітаміну покращує всмоктування та засвоєння заліза?

- А. Ціанокобаламіну
- В. Токоферолу
- С. **Аскорбінової кислоти**
- Д. Піридоксину
- Е. Кальциферолу

99. Як називається метод неінвазивного дослідження функції зовнішнього дихання, що проводиться для оцінки стану легень та бронхів, діагностики захворювань дихальної системи та контролю їх лікування?

- А. Бронхоскопія
- В. **Спірографія**
- С. Оглядова рентгенографія органів грудної клітки
- Д. УЗД легень
- Е. Шкірні алергологічні тести

100. Який суб'єктивний симптом найхарактерніший для кропив'янки?

- А. **Свербіж шкіри**
- В. Мерзлякуватість
- С. Іктеричність шкіри
- Д. Сльозотеча
- Е. Ціаноз шкіри

101. Пацієнтці віком 42 років встановлено діагноз: варикозна хвороба нижніх кінцівок. Укажіть найчастіше ускладнення цього захворювання.

- А. Параліч
- В. Системна склеродермія
- С. Сепсис
- Д. Кардіосклероз
- Е. **Тромбофлебіт**

102. Пацієнт віком 46 років скаржиться на різкий нападopodobний біль у поперековій ділянці з правого боку, що іррадіює в статеві органи та праве бедро, часте болоче сечовипускання, нудоту, блювання. В анамнезі: сечокам'яна хвороба. Об'єктивно спостерігається: пацієнт неспокійний, шкіра бліда, волога, температура тіла — 36,7°C, пульс — 92/хв, АТ— 100/60 мм рт. ст., симптом Пастернацького — позитивний праворуч. Які заходи долікарської допомоги необхідно надати пацієнту насамперед на догоспітальному етапі?

- A. Провести катетеризацію сечового міхура
- B. Застосувати газовідвідну трубку
- C. Промити шлунок
- D. Прикласти холодний компрес на поперекову ділянку
- E. **Прикласти грілку на поперекову ділянку**

103. Під час догляду та для допомоги пацієнту, у якого триває друга стадія гарячки (температура тіла — 39°C), сестра медична застосувала охолоджувальний компрес на лоб. Як часто його необхідно змінювати?

- A. Раз на добу
- B. **Кожні 2-3 хв**
- C. Через 1 год
- D. За вимогою
- E. Кожні 30 хв

104. Дорослому пацієнту проведено внутрішньошкірну пробу Манту. На 3-тю добу в місці ін'єкції з'явилася папула діаметром 7 мм. Інтерпретуйте результат проби.

- A. Негативна
- B. -
- C. Гіперергічна
- D. Сумнівна
- E. **Позитивна**

105. У чоловіка віком 28 років у ділянці верхньої губи візуалізуються гіперемія шкіри та дрібні міхурці з гнійним умістом, вкриті жовтими кірками, відмічається піднижньощелепний лімфаденіт. Для якої патології характерні вказані клінічні прояви?

- A. Мікроспорії
- B. Вітиліго
- C. Псоріазу
- D. **Сикозу**
- E. Бешихи

106. Чоловік віком 52 роки скаржиться на сильний оперізувальний біль у верхній половині живота, нудоту, блювання, рідкі випорожнення, здуття живота та слабкість, які виникли після вживання спиртних напоїв та жирної їжі. Об'єктивно спостерігається: блідість і сухість шкіри, пульс — 92/хв, ритмічний, АТ — 110/70 мм рт. ст. Яке додаткове дослідження доцільно провести пацієнту з метою уточнення діагнозу?

- A. Аналіз крові на глюкозу
- B. **Аналіз крові на α -амілазу**
- C. Загальний аналіз сечі
- D. Аналіз калу на приховану кров
- E. Дуоденальне зондування

107. Пацієнту з дихальною недостатністю призначено інгаляції кисню в об'ємі понад 5 л/хв. Які дії потрібно виконати для уникнення висушування слизової оболонки рота та дихальних шляхів?

- A. Стежити за тиском
- B. Підняти головний кінець ліжка
- C. Регулювати редуктор
- D. **Зволожити кисень**
- E. Обробити кисневий катетер олійним розчином

108. Який метод діагностики використовується для визначення прохідності вінцевих артерій?

- A. Електроенцефалографія
- B. Електрокардіографія
- C. **Коронарографія**
- D. Пневмотахометрія
- E. Ехокардіографія

109. Жінка віком 35 років перебуває на 39-му тижні вагітності. Вагітність I, передбачувана маса плода — 4200 г. Діагностовано тазове передлежання плода. Яка тактика ведення пологів у цьому разі?

- A. Вакуум-екстракція плода
- B. Накладання акушерських щипців
- C. Пологи через природні пологові шляхи
- D. **Кесарів розтин**
- E. —

110. У пацієнта на тлі перебігу гострого інфаркту міокарда у першу добу захворювання розвинулися такі симптоми: температура тіла — 37,6°C, підвищення рівня лейкоцитів, тропонінів, міоглобіну та С-реактивного протеїну у периферичній крові. Який синдром розвинувся в пацієнта?

- A. **Резорбтивно-некротичний**
- B. Гіпертензивний
- C. Сидеропенічний
- D. Менінгеальний
- E. Бронхообструктивний

111. Результати клінічного (загального) аналізу сечі пацієнта такі: сеча каламутна, з пластівцями та осадом, лейкоцитурія, бактеріурія, протеїнурія (менше 1 г/л). Для якого захворювання характерні такі лабораторні зміни в аналізі сечі пацієнта?

- A. Гострого гломерулонефриту
- B. Хронічної ниркової недостатності
- C. **Гострого пієлонефриту**
- D. Сечокам'яної хвороби
- E. Хронічного гломерулонефриту

112. Укажіть найнебезпечніше ускладнення, що може розвинутися в пацієнта під час блювання.

- A. Відрижка повітрям
- B. **Аспірація шлункового вмісту**
- C. Метеоризм

- D. Печія
- E. Відрижка шлунковим вмістом

113. У жінки віком 25 років після переохолодження з'явилися скарги на загальну слабкість, озноб, підвищення температури тіла до 38,5°C та тупий біль у поперековій ділянці з правого боку. Об'єктивно спостерігається: симптом Пастернацького позитивний праворуч, сеча каламутна, з гнійним осадом. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

- A. **Гострого пієлонефриту**
- B. Сечокам'яної хвороби
- C. Гострого циститу
- D. Гострого гломерулонефриту
- E. Амілоїдозу нирок

114. Сестра медична навчає пацієнта, якому діагностовано цукровий діабет 1-го типу, техніці введення інсуліну, зокрема наголошує на важливості дотримання точного дозування цього лікарського засобу. Яке ускладнення може розвинути в пацієнта, якщо він отримуватиме недостатню дозу інсуліну?

- A. Гіпоглікемія
- B. Ліподистрофія
- C. Медикаментозна емболія
- D. Тромбофлебіт
- E. **Гіперглікемія**

115. За призначенням лікаря сестра медична проводить забір венозної крові пацієнта вакуумною системою. Які дії потрібно виконати із заповненою кров'ю пробіркою?

- A. **Акуратно перевернути її 5-8 разів для повного змішування вмісту**
- B. Підігріти її вміст до температури 37°C
- C. Перелити її вміст в іншу ємність
- D. Енергійно струсити до повного змішування її вмісту
- E. -

116. Який із нижченаведених фізіотерапевтичних засобів місцевого впливу можна використати для допомоги пацієнту, в якого триває друга стадія гарячки?

- A. Медичні банки
- B. Гірчичники
- C. Зігрівальний компрес
- D. **Міхур із льодом**
- E. Медичну грілку

117. Роділля, у якої триває другий період пологів, відчула різкий біль у ділянці дна матки. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, АТ — 90/60 мм рт. ст., пульс — 96/хв, матка в гіпертонусі, різко болюча, у ділянці її дна пальпується випинання. Положення плода поздовжнє, голівка розташована в порожнині малого таза, серцебиття плода — 180/хв, приглушене, аритмічне. Укажіть подальшу тактику ведення пологів.

- A. Плодоруйнівна операція
- B. **Накладання акушерських щипців**
- C. Спостереження за роділлем
- D. Стимуляція пологової діяльності
- E. Кесарів розтин

118. У чоловіка після вживання цитрусових з'явився висип на шкірі у вигляді червоних плям різних розмірів і форми, що супроводжується свербіжем. Для якої патології характерні ці клінічні прояви?

- A. Сироваткової хвороби
- B. Псоріазу
- C. Системного червоного вовчака
- D. **Кропив'янки**
- E. Екземи

119. Пацієнтка віком 59 років скаржиться на слабкість у правій верхній та нижній кінцівках, утруднення мовлення, порушення зору. Об'єктивно спостерігається: АТ — 190/90 мм рт. ст., пульс — 72/хв, ритмічний, гіпертонус м'язів правих кінцівок, моторна афазія. За декілька годин спостереження симптоматика регресувала. Для якої патології характерні вказані клінічні прояви?

- A. **Транзиторної ішемічної атаки**
- B. -
- C. Ішемічного інсульту
- D. Геморагічного інсульту
- E. Гіпертонічного церебрального кризу

120. У пацієнта, який хворіє на рак легень, раптово, під час кашлю розпочалося виділення пінистої яскраво-червоної крові з рота. Які заходи долікарської допомоги доцільно розпочати негайно?

- A. Провести сліпе зондування
- B. Дати вдихнути пари нашатирного спирту
- C. Промити шлунок
- D. **Застосувати помірне охолодження грудної клітки**
- E. Прикласти грілку на грудну клітку

121. Пацієнтка скаржиться на зміну гостроти зору, двоїння в очах, погіршення сну, пітливість, дратівливість, зменшення маси тіла за збереженого апетиту. Об'єктивно спостерігається: тремор рук і тіла, пульс — 110/хв, екзофтальм, збільшення розмірів щитоподібної залози. Попередній діагноз: дифузний токсичний зоб. Який із нижченаведених факторів посідає перше місце серед можливих причин розвитку цього захворювання?

- A. Куріння
- B. Переохолодження
- C. Порушення дієти
- D. **Психотравма**
- E. Шкідливі звички

122. Для якого захворювання нирок характерний такий симптомокомплекс: підвищення артеріального тиску, олігурія, набряки?

- A. Гострої ниркової недостатності
- B. Хронічної ниркової недостатності
- C. Хронічного пієлонефриту
- D. Сечокам'яної хвороби
- E. **Гострого гломерулонефриту**

123. У гастроентерологічному відділенні лікується пацієнт із діагнозом: виразкова хвороба шлунка. Які лікарські засоби пригнічують секрецію шлункового соку?

- A. Антибактеріальні
- B. Нестероїдні протизапальні
- C. Антигістамінні
- D. Антацидні
- E. **Інгібітори протонної помпи**

124. Бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги транспортує пацієнта з підтвердженим діагнозом: туберкульоз — до спеціалізованого закладу охорони здоров'я. Який бар'єрний засіб захисту від можливого інфікування необхідно застосувати членам бригади?

- A. Хірургічну маску
- B. Хірургічні рукавички
- C. **Респіратор**
- D. Захисний екран
- E. Халат

125. У дівчини віком 19 років на шкірі грудної клітки, шиї, бічних поверхонь тулуба, міжлопаткової ділянки та плечей виявлено численні незапальні плями жовтувато-коричневого та блідо-рожевого кольору. Позитивні «симптом стружки» (лущення плям у разі пошкрябування) та йодна проба Бальцера. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

- A. **Висівкоподібного лишая**
- B. Токсикодермії
- C. Мікроспорії
- D. Контактного простого дерматиту
- E. Справжньої екземи

126. Під час операції на неушкоджену шкіру сестри медичної, яка асистує лікарю, потрапила кров. Укажіть засіб, яким необхідно промити шкіру в цьому разі.

- A. **Водою з милом**
- B. Етиловим спиртом
- C. Дезінфікуючим розчином
- D. Антисептиком
- E. Фізіологічним розчином

127. Пацієнту, який хворіє на бронхоектатичну хворобу, призначено масаж грудної клітки та дихальну гімнастику. Укажіть мету проведення цих процедур.

- A. Полегшення больових відчуттів
- B. Загартовування організму
- C. Профілактика набряку легень
- D. Попередження кровохаркання
- E. **Полегшення процесу відходження мокротиння**

128. У пацієнта, який хворіє на дифузний токсичний зоб, спостерігається симптом «телеграфного стовпа». Укажіть клінічні прояви цього симптому.

- A. Ністагм
- B. Атактична хода
- C. Девіація язика

- D. Переміжна кульгавість
- E. **Тремор всього тіла**

129. Який із нижченаведених чинників сприяє розвитку виразкової хвороби?

- A. Переохолодження
- B. Алергени
- C. **Стрес**
- D. Молодий вік
- E. Ожиріння

130. Чоловіку віком 37 років для лікування пептичної виразки дванадцятипалої кишки призначено фамотидин. Яка основна фармакологічна дія цього лікарського засобу?

- A. Антигістамінна
- B. Спазмолітична
- C. **Антисекреторна**
- D. Бактерицидна
- E. Бактеріостатична

131. Пацієнту пульмонологічного відділення встановлено діагноз: пневмонія — та призначено оксигенотерапію через носові канюлі. Через який інтервал часу рекомендується перевіряти стан носових канюль для забезпечення впевненості у їхній прохідності та можливості надходження кисню, а також контролю швидкості подачі кисню і його концентрації?

- A. **Кожні 8 год**
- B. Кожні 2 год
- C. Кожні 3 год
- D. Кожні 40 хв
- E. Кожні 30 хв

132. Укажіть співвідношення денного діурезу до нічного в нормі.

- A. 1:1
- B. 1:4
- C. -
- D. 1:3
- E. **3:1**

133. Пацієнт скаржиться на інтенсивний біль у першому плесно-фаланговому суглобі, що виник уночі. Об'єктивно спостерігається: уражений суглоб набряклий, гіперемований, гарячий на дотик, рухи в ньому обмежені. У крові виявлено високий рівень сечової кислоти. Для якого захворювання характерні ці клініко- лабораторні показники?

- A. **Подагри**
- B. Первинного коксартрозу
- C. Ревматоїдного артриту
- D. Хвороби Рейно
- E. Панарицію

134. Пацієнт скаржиться на інтенсивний біль і відчуття поколювання в руках, судоми в м'язах кистей. З анамнезу відомо, що пацієнт протягом 10-ти років працює забійником у шахті. Об'єктивно спостерігається: кисті ціанотичні, холодні на дотик, зниження больової чутливості за типом «рукавичок». Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

- A. **Пневмоконіозу**

- В. Системної склеродермії
- С. **Вібраційної хвороби**
- Д. Ревматоїдного артриту
- Е. Цукрового діабету

135. Дорослому пацієнту встановлено діагноз: бронхіальна астма. Який шлях введення ліків має перевагу під час надання невідкладної допомоги пацієнту у разі нападу бронхіальної астми?

- А. Ректальний
- В. **Інгаляційний**
- С. Ентеральний
- Д. Ін'єкційний
- Е. Сублінгвальний

136. У пацієнта, який хворіє на хронічний ентерит, упродовж 5-ти днів спостерігаються часті рідкі випорожнення (до 15 разів на добу) світло-жовтого кольору зі шматочками неперетравленої їжі. Пацієнт скаржиться на загальну слабкість, головний біль, запаморочення, апатію, спрагу, значну втрату маси тіла. Який патологічний процес розвивається в організмі пацієнта?

- А. Дефіцит заліза
- В. **Зневоднення (дегідратація)**
- С. Гіпокальціємія
- Д. Гіпергідратація (затримка води)
- Е. Дефіцит вітаміну D

137. У якому віці згідно з Календарем профілактичних щеплень в Україні проводиться четверте щеплення проти кашлюку, дифтерії та правця дітям?

- А. 3 роки
- В. **18 місяців**
- С. 6 років
- Д. 12 місяців
- Е. 6 місяців

138. Укажіть інструментальний ендоскопічний метод дослідження прямої та сигмоподібної кишок.

- А. **Ректороманоскопія**
- В. Фіброгастроскопія
- С. Іригоскопія
- Д. Колоноскопія
- Е. Холангіографія

139. Для якого захворювання характерні такі клінічні прояви: гострий початок, слабо виражені катаральні явища, дрібний блідо-рожевий плямисто-папульозний висип, без тенденції до злиття, з переважною локалізацією на спині, сідницях та розгинальних поверхнях верхніх кінцівок, системне збільшення лімфатичних вузлів?

- А. **Краснухи**
- В. Вітряної віспи
- С. Скарлатини
- Д. Менінгококової інфекції
- Е. Кору

140. Пацієнту встановлено діагноз: пептична виразка шлунка. Який із нижченаведених лікарських засобів, що входить до складу квадритерапії цього захворювання, пригнічує продукцію кислоти шлункового соку, сприяє зменшенню больових відчуттів у шлунку та усуває печію?

- A. Вісмуту субцитрат (де-нол)
- B. —
- C. **Омепразол**
- D. Амоксицилін
- E. Кларитроміцин

141. Укажіть оптимальну температуру води для проведення очисної клізми пацієнту з атонічним закрепом.

- A. 37-38°C
- B. **18-20°C**
- C. 38-40°C
- D. 25-30°C
- E. 28-32°C

142. Який вид анестезії доцільно застосувати під час оперативного лікування підшкірного панарицію?

- A. Інфільтраційну
- B. **За Оберстом-Лукашевичем**
- C. За Вишневським
- D. Внутрішньокісткову
- E. Термінальну

143. Який розмір периферичного венозного катетера переважно використовується для внутрішньовенних інфузій у новонароджених дітей?

- A. 20G
- B. **26G**
- C. 18G
- D. 16G
- E. 14G

144. Чоловік скаржиться на періодичні закрепи, випорожнення з домішками крові та переймоподібний біль у животі. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, живіт бере участь в акті дихання, м'який. У лівому підребер'ї пальпується щільне болюче утворення. Який інструментальний діагностичний метод використовується для дослідження всіх відділів товстого кишечника та взяття біопсії?

- A. Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини
- B. **Колоноскопія**
- C. Ректороманоскопія
- D. Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини
- E. Іригоскопія

145. У породіллі через тиждень після пологів підвищилася температура тіла до 39°C, з'явилися біль унизу живота, озноб, нудота, головний біль. Під час гінекологічного дослідження виявляються гнійні виділення з цервікального каналу, потовщення, набряки та біль у ділянці придатків матки. Яке захворювання розвинулося в жінки?

- A. **Сальпінгоофорит**

- В. Ендометрит
- С. Пельвіоперитоніт
- Д. Перитоніт
- Е. Лохіометра

146. Укажіть місце накладання електрода із зеленим маркуванням під час проведення електрокардіографії.

- А. Права нога
- В. **Ліва нога**
- С. Ліва рука
- Д. Права рука
- Е. -

147. Який із нижченаведених методів дослідження є найінформативнішим у діагностиці бронхоектатичної хвороби?

- А. Бронхіальна артеріографія
- В. Велоергометрія
- С. **Бронхографія**
- Д. Ларингоскопія
- Е. Спірометрія

148. Яке співвідношення розчинника та активної речовини антибіотика використовується у разі стандартного розведення антибіотика?

- А. 2 мл на 200 000 ОД
- В. 2 мл на 100 000 ОД
- С. 5 мл на 100 000 ОД
- Д. 1 мл на 500 000 ОД
- Е. **1 мл на 100 000 ОД**

149. Укажіть основний синдром, що характерний для перебігу початкового періоду скарлатини.

- А. **Інтоксикаційний**
- В. Бронхообструктивний
- С. Диспептичний
- Д. Геморагічний
- Е. Менінгеальний

150. Сестра медична проводить заміну та сортування постільної білизни тяжкохворого пацієнта. Класифікуйте ступінь забруднення текстильних виробів, якщо вони значно забруднені кров'ю та іншими біологічними виділеннями пацієнта?

- А. III
- В. II
- С. **IV**
- Д. -
- Е. I